

EE Kasutusjuhend

Koostis: Dimetikoon (92%), keskmise ahelaga triglütseriidid, jojobavaha, lõhnaained
Näidustused: NYDA®t kasutatakse peatäide nakkuse (täitõbi) füüsiliseks raviks. Kui NYDA®t kasutatakse vastavalt juhistele, on see efektiivne ka täimunade (tingude) vastu.

Toimemehhanism: NYDA® ei sisalda kahjulikke putukamürke. Lahus tungib sügavale täide, noortäide ja munade (tingude) hingamissüsteemi, mis viib nende lämbumiseni. Kuna see toimemehhanism on füüsikaline, ei ole täide resistentsuse kujunemine võimalik.

Vastunäidustused: NYDA®t ei tohi kasutada inimesed, kes on teadaolevalt ülitundlikud toote mis tahes koostisosade suhtes. Juhul kui tekib allergiline nahareaktsioon, tuleb ravi NYDA®ga otsekohe lõpetada.

Hoiatused:

- NYDA® on mõeldud ainult välispidiseks kasutamiseks.
- NYDA®t kasutades ärge laske lahusel sattuda silma ega limaskestadele (ninna ja kurku). Kui lahus satub koge-mata silma, loputage silmi 10–15 minuti jooksul rohke veega. Ärrituse püsimisel pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- NYDA®t ei tohi sisse hingata.
- NYDA® võib reageerida teatud juuksehooldusvahendite või juuksevärvidega.
- Kuna mõned NYDA® koostisosad on kergesti süttivad, ei tohi seda kasutada lahtise tule või kuumaalikate lähedal. Hoidke NYDA®t eemal süüteallikatest ja ärge suitsetage ravi ajal.
- Kui NYDA®t on kogemata maha valgunud, esineb oht libastuda. Seetõttu tuleb mahavalgunud aine otsekohe ära pühkida.

Kõrvaltoimed: Harvadel juhtudel võivad selle toote üks või mitu koostisosa vallandada allergilisi nahareaktsioone. Need esinevad põletiku, turse, punetuse või lööbena.

Millele pöörata tähelepanu teatud patsiendirühmades:

NYDA® sobib kasutamiseks igas vanuses ning seda võib kasutada ka raseduse ja imetamise ajal.

Kasutusjuhend: Palun järgige neid juhiseid, et kõrvaldada edukalt peatäide nakkus.

Kuidas NYDA®t õigesti kasutada: Enne NYDA® esmakordset kasutamist tuleb klaaspudelile keerata pakendis olev jaotuspump. Selleks eemaldage pudelilt keeratav kork ja keerake tugevasti külge jaotuspump. Hoidke pihustipudelit alati püsti, vastasel juhul ei saa pump korralikult töötada. Palun pange tähele, et esmakordsel kasutamisel või kui seda ei ole pikka aega kasutatud, tuleb pumba täitmiseks sellele mitu korda vajutada.

Enne ravi NYDA®ga: Kontrollige kõigi pereliikmete juukseid NYDA® täikammi abil.

Ravige kõiki, kellel on täid, samal päeval, et vältida uut nakkust. Pusade eemaldamiseks juustest enne ravi võib kasutada tavalist kammi. Seda kammi tuleb pärast kasutamist korralikult puhastada.

NYDA® ravi:



1. Masseerige NYDA® lahus hoolikalt kuivadesse juustesse.

NYDA® tuleb kanda kuivadesse juustesse. Pihustage NYDA®t hoolikalt juustele kogu pikkuses. Masseerige lahus korralikult sisse, kuni juuksed on täielikult lahusega niisutatud. Selleks võib kasutada näiteks täikammi. See tagab, et kõik täid, noortäid ja munad (tingud) puutuvad lahusega kokku ja toode saab toimida optimaalse efektiivsusega. Vajalik NYDA® kogus sõltub juuste paksusest ja pikkusest. Veenduge, et juuksed on eriti hästi NYDA®ga kaetud just peanaha lähedal ning kõrvade taga, kuna seal on täisid ja tingusid kõige rohkem.



2. Jätke NYDA® juustesse ja laske mõjuda 1 tund.

Täimunad (tingud) on väga vastupidavad ning neid on eriti raske eemaldada.

Seepärast peate jätma NYDA® juustesse vähemalt 1 tunniks. Kohe pärast NYDA® toimimisaja möödumist ei ole te teistele enam nakkusohtlik.

3. 1 tunni pärast kammige hoolikalt juukseid täikammiga.

Pärast seda, kui NYDA®t on peas hoitud vähemalt 1 tund, võite te juukseid hoolikalt täikammiga kammida, et eemaldada lämbunud täid. NYDA® muudab kammimise lihtsamaks, kuna sisaldab spetsiaalseid koostisosi, mis muudavad isegi pikad juuksed väga kergesti kammitavaks.



Kuidas täikammi õigesti kasutada?

Jagage juuksed peas mitmeks osaks ning iga osa omakorda peenteks salkudeks. Kammige iga salk eraldi läbi, alustades peanahale nii lähedalt kui võimalik, st kammides juukseid juurtest kuni otsteni. Pöörake iga läbikammitud juuksesalk kõrvale ning puhastage kammi enne jätkamist paberrätikuga.

Tähtis: hoidke kammi nii, et kirjaga külg jääks pea poole.



4. Peske NYDA® välja tavalise poešampooniga.

1 tunni möödudes saab NYDA® tavalise šampooniga juustest välja pesta. Kui pärast esimest pesu on juustesse jäänud lahuse jäägid, saab need kergesti eemaldada teise juuksepesuga.

5. Ravitulemuste kontroll.

Alati tuleb juuksed üle kontrollida 8–10 päeva pärast ravi. Vajadusel tuleb NYDA® kasutamist korrata nii nagu eespool kirjeldatud. Ravi NYDA®ga on ohutu ja seda võib mitmeid kordi korrata.

Juhised säilitamiseks: Hoida temperatuuril kuni 25 °C. NYDA®t ei tohi kasutada pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Meditsiiniseadmeid tuleb säilitada ettevaatusega. Hoida laste eest kättesaamatus kohas.

Teabe uuendamise kuupäev: Aprill 2017



Keelatud on suitsetada ja viibida lahtise leegi läheduses.

Kuna mõned NYDA® koostisosad on kergesti süttivad, ei tohi seda kasutada lahtise tule või kuumaalikate lähedal. Hoidke NYDA®t eemal süüteallikatest ja ärge suitsetage ravi ajal.

POHL BOSKAMP

CE 0482

Tootja esindaja Eestis:

KBM Pharma OÜ, Tähtvere 4, 51007 Tartu; www.peataid.com



G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Kieler Str. 11, 25551 Hohenlockstedt, Saksamaa; www.nyda.com